

UN CASO DE SIFILIS DE RIÑON

Por los Dres. LEONIDAS REBAUDI y ERNESTO BARNETCHE

Enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico, la sífilis de riñón se descubre la mayor parte de las veces en la mesa de autopsias.

Algunos autores la dividen en:

- 1º) Nefritis parenquimatosa aguda sifilítica.
- 2º) Nefritis crónica intersticial de origen sifilítico.
- 3º) Riñón amiloideo sifilítico.
- 4º) Goma de riñón.

Las formas más frecuentes son sin duda la primera y la cuarta.

La primera, sífilis renal del período secundario, se ha presentado algunas veces con antelación a la roseola acompañada de edema y de gran cantidad de albúmina en la orina, con Wassermann francamente positiva: en un caso descrito por Rinaldi se encontraron espiroquetas en la orina. La siembra hematógena de las espiroquetas es la causa de la afección renal sea en realidad ésta o sus toxinas las causales de insulto renal concuerdan con afecciones parenquimatosas generalizadas.

Durante un tiempo se discutió apasionadamente atribuyendo algunos autores la afección renal al tratamiento mercurial y otros a la acción tóxica de la espiroqueta. El sedimento lipoideo en la orina transa la cuestión atribuyendo el insulto renal a la espiroqueta.

La lesión no es siempre grave y existen formas atenuantes.

El diagnóstico se basaría en la comprobación de sífilis reciente y en la reacción de Wassermann positiva, en la albuminuria elevada en la orina y en la presencia de la espiroqueta pálida en la misma y por último en la acción curativa del tratamiento antisifilítico.

El goma sifilítico del riñón es una afección rara en la mayor parte de las veces, el diagnóstico se hace generalmente durante la autopsia.

La sífilis gomosa se presenta en la forma de numerosos nódulos variables en cuanto a su dimensión desde un grano de mijo al de una nuez, generalmente corticales pueden ser también medulares. Su periferia es gris y transpa-

- 3) Riñón amiloideo sifilítico.
- 4) Goma de riñón.

Las formas más frecuentes son sin duda la 1ª y 4ª.

El caso descrito se trata de goma sifilítico múltiple de riñón izquierdo, localizado en la medular. Se hace diagnóstico por los antecedentes por la pielografía por relleno y por el resultado del tratamiento.
