
SERVICIO UROLOGIA HOSPITAL ITALIANO

Jefe: Dr. PAGLIERE

SECUELA DE UNA COMPLICACION DE LA DIATERMIA URETRAL

Por los doctores

L. PAGLIERE y T. SCHIAPPAPIETRA

H. C., Italiano; 25 años. Empleado.

Su primera uretritis la refiere a los 22 años, que pasa luego al estado de cronicidad, con aparición irregular de pequeña secreción. Diez años después, persiguiendo su curación, tocó en turno a la diatermia uretral, y con tan mala suerte que le bastó con la primera sección. Una intensa sensación de quemadura seguida de uretrorragia y fuertes ardores a la micción, como fenómenos inmediatos; a poco, eliminación de tejidos esfacelados y luego disuria progresiva, a pesar de la dilatación mantenida, obligando a una primera uretrotomía cuatro años después.

Todos los cuidados, todos los tratamientos que el sujeto ha cumplido con observación, y que los urólogos han aplicado con inteligencia, no fueron suficientes para impedir la vía crucis uretral que este pobre prójimo ha tenido y tendrá que soportar.


Agosto 3|932.

Es tan grande su disuria, que el enfermo debe tener tiempo espacioso para decidirse a orinar, el chorro es fino y entrecortado; debe efectuar una larga expresión de la uretra bulbar para terminar la micción.

La orina es mucopurulenta.

La uretra peneana se palpa indurada.

Exploración. — Puesta la uretra en extensión: a 5 cm.



aproximadamente del meato, sólo permite el paso a un explorador No. 9, y con un roce duro, áspero e irregular en casi todo su trayecto penetra en vejiga; al retirarlo, el talón casi retenido a 11 cm. del meato; toda esa porción es un largo estrecho fibroso.

DISCUSION

CASTAÑO E. —

Recuerda un caso con esclerosis total de uretra por una electrocoagulación.