

PATOLOGIA UROLOGICA COMO CAUSA DE INVALIDEZ EN LA ARGENTINA

Dres.: Adalberto C. VAGLICA y Hernán SERRA.

INTRODUCCION.

El objeto de esta comunicación es presentar un estudio de la incidencia de la patología urogenital como factor invalidante de un grupo de 34617 peticionantes de beneficios ante las Cajas Nacionales de Previsión de la República Argentina.

Dichas personas realizaron el pedido de jubilación o pensión basadas en el hecho de padecer una patología que los invalidaba para el desempeño de sus tareas habituales.

MATERIAL Y METODO:

La estadística fue elaborada tomando datos de los dictámenes de Estado de Seguridad Social del Ministerio de Bienestar Social distribuidos por todo el país. Dicho dictamen fue controlado, codificado y volcado en un formulario que permite su perfoverificación en tarjeta Hollerit.

La información fue leída por un equipo de computación IBM y grabada en cinta magnética. Posteriormente, al procesar dichas cintas, se generaron los listados y cruces para su análisis y conclusión. Los códigos empleados son numéricos excepto una posición que es alfa-numérica.

A los efectos de la codificación, se emplearon la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), edición 1970 y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también en su edición 1970.

Los listados tomados en cuenta en este trabajo son:

- 1) Patología Principal - o sea la enfermedad que produjo la invalidez
- 2) Provincia o área de radicación.
- 3) Sexo.
- 4) Profesión.
- 5) Edad a la fecha del dictamen.
- 6) Patología agregada - la que acompaña a la causa invalidante.

Con dichos listados se confeccionaron los siguientes cruces

PATOLOGIA UROLOGICA COMO CAUSA DE INVALIDEZ EN LA ARGENTINA

estadísticos:

- 1) Patología por Provincia.
- 2) Patología por Sexo.
- 3) Patología por Profesión.
- 4) Patología por Edad.

RESULTADOS.

Del total de 34617, 736 correspondieron a patología genitourinaria, y de ellos 476 a patología principal y 266 a patología agregada. Las enfermedades detectadas por aparato, fueron en orden decrecientes: (Cuadro 1).

Aparato Cardiocirculatorio	14.950 casos	42,8 %
Sistema Osteomuscular y tejido conjuntivo	7.327 "	20,8 "
Sistema Nervioso y órganos de los sentidos	3.051 "	8,8 "
Trastornos Mentales	1.968 "	6,0 "
Aparato Respiratorio	1.610 "	4,5 "
Tumores (neoplasmas)	1.277 "	3,4 "
Accidentes, envenenamientos, violencias	1.050 "	3,1 "
Enfermedades Infecciosas y parasitarias	989 "	2,8 "
Aparato genitourinario	736 "	2,1 "
Otros	1.709 "	5,7 "
TOTAL	34.617 "	100,0 "

De lo expuesto , surge que del total de 34.617 casos, sólo el 2,1 por ciento o sea 736 casos, correspondieron a uropatías detectadas.

Dentro de las mismas, la mayor incidencia corresponde a:

Procesos inespecíficos renoureterales	104 casos
Nefritis no calificada	83 casos
Nefritis crónica	48 casos
Tumores malignos de vejiga	42 casos
Tumores malignos de prostata	37 casos
Litiasis urinaria	34 casos
Hiperplasia prostática	23 casos
Tumores malignos otros organos urinarios	22 casos
Sifilis	17 casos
Sintomas y estados morbosos mal definidos	17 casos
Nefritis aguda	13 casos

resto	296 casos
TOTAL	736 casos

El grupo denominado resto, con 296 casos, incluye pacientes aislados con TBC urinaria, Tumores malignos, de testículo, Varicocele, Esclerosis renal, Uronefrosis, Cistitis, Uretritis, Estrechez uretral, etc..

La incidencia de tumores es del 16,4 por ciento (121 casos), siendo el segundo grupo en importancia. El detalle del total de los casos es el siguiente: (Cuadro 2).

Tumores malignos vejiga	42 casos	35,0 %
Tumores malignos prostata	37 casos	30,8 "
Tumores malignos riñon, Ureter, Uretra	22 casos	18,3 "
Tumores malignos testículo	19 casos	7,4 "
Tumores malignos otros organos genitales	5 casos	4,1 "
Tumores malignos retroperitoneales	3 casos	2,0 "
Tumores benignos genital masculino	1 caso	0,8 "
Tumores benignos organos urinarios	1 caso	0,8 "
Tumores de naturaleza y órgano no especificados	1 caso	0,8 "
TOTAL	121 casos	100,0 "

Accesoriamente al tema patologías, se consideraron además la relación de las mismas con respecto a provincia de domicilio, sexo profesión y edad de los invalidados.

La mayor cantidad de casos, 43,03 por ciento, fueron detectados en la Provincia de Buenos Aires, siguieron luego en orden decreciente: Santa Fé con el 22,48 por ciento, Capital Federal que aportó el 13,03 por ciento y Córdoba con el 6,98 por ciento. El resto de los casos se encuentra repartido entre las restantes provincias del país.

Refiriéndose a sexo, 541 casos fueron de sexo masculino y 195 femenino. Respecto al cruce patología por Profesión, el número de casos por grupo profesional, respondió a las siguientes cifras:

- 9 profesionales y técnicos.
- 1 administradores, gerentes y directores.
- 22 empleados de oficina.
- 118 comerciantes y vendedores.
- 125 agricultores y otros trabajadores agrícolas.
- 2 mineros, canteros y trabajadores asimilados.
- 29 transportes y comunicaciones.
- 224 artesanos, trabajadores de manufacturas y peones
- 31 servicios, deportes y diversiones.
- 37 no clasificados según tabla.
- 120 profesión no especificada.
- 18 no codificados.

PATOLOGIA UROLOGICA COMO CAUSA DE INVALIDEZ EN LA ARGENTINA

En cuanto al cruce Tumores Malignos por Progesión, se observó la siguiente incidencia: (Cuadro 3).

	VEJIGA	PROSTATA	RIÑON	TESTICULO.
Artesanos	17/224	21/224	9/224	5/224
Agricultores	7/125	5/125	6/125	1/125
Comerciantes	5/118	8/118	5/118	1/118
Scios. Deportes	3/31	1/31	--	--
Mineros	1/2	1/2	--	--
Profesionales	1/9	--	--	1/9
No especific.	8/120	1/120	2/120	1/120
TOTAL	42	37	22	9

Por último, debemos referirnos a la incidencia de patologías por edad, En dicho cruce observamos:

De 0 a 17 años	13 casos	1,30 por ciento.
De 18 a 49 años	146 casos	19,96 por ciento.
De 50 a 54 años	125 casos	17,00 por ciento.
De 55 a 59 años	161 casos	22,06 por ciento.
De 60 a 64 años	176 casos	23,96 por ciento.
De 65 a 69 años	186 casos	11,77 por ciento.
De 70 a 94 años	29 casos	3,95 por ciento.

CONCLUSIONES.

El presente trabajo estadístico realizado sobre una muestra de 34.617 casos, demuestra la incidencia de patología urogenital como factor determinante de incapacidad laboral. La nombrada patología fué detectada en 736 casos, cifra que representa el 2,1 por ciento del total.

A pesar de los escaso de la muestra, se realizaron además cruces con distintos parámetros que permiten evaluar la incidencia de enfermedad urológica, por sexo, edad, profesión y provincia de residencia. En los resultados obtenidos no se observó predominancia absoluta de determinada patología con respecto a alguna profesión en particular, sino que por el contrario, la distribución de las mismas fue bastante uniforme. Si se observó mayoría de enfermos de sexo masculino en una proporción de casi: 3:1 y un pico máximo en cuanto a edades que se ubica entre la quinta y sexta década de vida.

Se destaca además la importancia de la patología oncológica como factor invalidantes, siendo las más observadas, la vesical y prostática.

Es de esperar que futuras comparaciones con estudios

estadísticos de mayor número de casos, permitan la obtención o no de premisas que facilitan el tomar medidas sanitarias a fin de evitar en lo posible la presencia de patología genitourinaria en la población activa de nuestro país.

SUMARIO.

Se presenta un trabajo estadístico realizado sobre una muestra de 34.617 casos, donde se demuestra la incidencia de patología urogenital como factor determinante de incapacidad laboral.

SUMMARY.

We present an statistical research based on a sample of 34.617 cases where we show the incidence of urogenital pathology as a determinant factor of laboral incapacity.

Dolor...

Dioxadol

(PROPOXIFENO + TERAPIROL)

ANALGESICO TOTAL

Posología: COMPRIMIDOS: 1 comprimido recubierto
2 a 4 veces por día

INYECTABLE: 1 ampolla: 1 a 2 veces por día
via I.M. o I.V.

SUPOSITORIOS: 1 supositorio: 2 a 4 veces por día

PRESENTACION: ENVASE con 16 y 32 comprimidos
ENVASE con 5 ampollas
ENVASE con 6 supositorios



Productos MARXER
Fabricado por:
Laboratorios Bagó S.A.