

COLICO RENAL (Infrecuente consecuencia)

Dr. Metz, León María

Resumen

Se presenta una dilatación del uréter terminal izquierdo causado por dos coágulos organizados, aparecidos luego de un cólico renal con hematuria, cuyas imágenes radionegativas en la luz ureteral obligaron a la exploración quirúrgica.

El paciente M.O., de 23 años, historia clínica Nº 8056/2 de I. M. A., se internó de urgencia por un cólico renal de gran intensidad, acompañado de hematuria. Rx simple de árbol urinario: abundantes gases intestinales, no se ven sombras litiásicas. Urograma: exclusión renal izquierda. Se indica tratamiento médico con mejoría del paciente y desaparición de la hematuria. Urograma a los 10 días (fig. 1): dilatación pielocalicial izquierda alta, con detención de sustancia de contraste a nivel de tercera vértebra lumbar, en uréter izquierdo.



Figura 1

Urograma a los 20 días (fig. 2): imagen de litiasis trasparente alargada en el uréter terminal con mejoría de la función renal, pese a persistir el cuadro doloroso.




Figura 2

Urograma al mes: mejora aún la función renal y se localizan 2 imágenes trasparentes, más pequeñas, en la misma zona.

Frente a la persistencia del cuadro doloroso, la necesidad de resolver el problema planteado por la angustia familiar y la duda diagnóstica y al tratamiento "ineficaz", se interviene con el diagnóstico de doble litiasis trasparente del uréter inferior. Incisión paramediana pararectal externa infraumbilical izquierda: se localiza el uréter algo dilatado no palpándose a nivel de la zona portadora de la patología concreción alguna; se realiza la ureterotomía extrayendo (fig. 3) dos cálculos negruzcos, blandos, con las características de coágulos organizados; cierre del uréter y drenaje por contrabertura.

Satisfactoria evolución (fig. 4).




Figura 3




Figura 4