

Uretra doble completa en un paciente de 26 años Complete double urethra in a 26 years patient

Dr. Germán M.J. Chéliz

La uretra doble se manifiesta por anomalía y número de la uretra y ocasionalmente de los meatos uretrales.

En el caso específico del hipospadias el meato se localiza lejos de la punta del glande a lo largo de la cara ventral del pene.

Por el contrario, en el epispadias el meato se localiza dorsalmente, en el cuerpo peneano.

En el caso particular de la uretra doble, frecuentemente ambas uretras desembocan en un meato común. Lo más habitual de ver es una uretra dorsal accesoria incompleta, terminando en fondo de saco en el tercio medio del pene. Frecuentemente se asocian con una curvatura peneana congénita ventral.

En este caso observamos dos meatos uretrales (Figuras 1 y 2) en un paciente que además consulta por epididimitis reiteradas asociadas con el inicio de la actividad sexual del mismo. En este caso en particular ambos meatos son evidentes y notorios.

Al realizar una uretrografía retrógrada se comprueba la longitud manifiesta de la uretra secundaria que desemboca en la uretra subsfinteriana, hallazgo que se confirma por medio de una endoscopia uretral bajo anestesia con un ureteroscopio de bajo calibre (Figura 3).

Hospital Durand - División Urología
Sector Patología Reconstructiva genital
gcheliz@yahoo.com.ar



Figura 1. Vista frontal del glande. Se observa claramente ambos meatos, dorsal el accesorio y ventral el principal



Figura 2. Primer plano del meato accesorio, sobrelevado, más evidente que el principal.



Figura 3. Uretrografía retrógrada simultánea por ambos meatos. La uretra principal es evidente y ventral con respecto a la secundaria.