

## Estrangulamiento peneano con el pico de una botella plástica

### Penile strangulation by neck of a plastic bottle

Dres. Alvarez Patricio;  
Del Sordo Martín;  
Ortiz Federico.

Las lesiones peneanas por estrangulamiento son poco frecuentes y pueden ser ocasionadas por diversos objetos (anillos metálicos, hilos, gomas, etc.). Las causas también son variadas, pero están relacionadas, principalmente, con fines masturbatorios o para mantenimiento de una erección.

El estrangulamiento del pene produce inicialmente un edema distal por bloqueo del retorno venoso y linfático, que imposibilita la extracción del objeto. El mantenimiento de esta situación puede llegar a comprometer la circulación arterial cutánea y del tejido celular laxo peneano con la consiguiente necrosis de dichas estructuras.

Presentamos el caso clínico de un varón de 62 años que concurrió a nuestro Servicio por presentar importante edema peneano y dificultad miccional por estrangulamiento con el cuello de una botella plástica de gaseosa a nivel de la base del miembro. Al momento de la consulta llevaba 24 horas de colocado el cuerpo extraño y refirió que se lo colocó para lograr mantener más tiempo su erección. El mismo fue retirado utilizando una pinza tipo alicate, constatándose laceración de la piel en toda la circunferencia de la base peneana, sin evidencia de necrosis.



División Urología del Hospital de  
Clínicas "José de San Martín".  
UBA, Buenos Aires, Argentina.

Jefe de División:  
Prof. Dr. Osvaldo Mazza