

## Tumor de riñón y pseudometástasis en bazo

### Indolent splenic mass in the setting of renal cell carcinoma

Dres. Paterlini Juan;  
Richards Nicolas;  
Ameri Carlos.

Se trata de un paciente de 49 años de edad que consultó por hematuria macroscópica y dolor abdominal. Antecedente de cólico renal izquierdo a los 29 años.

Se solicita ecografía que informa masa ocupante sólida en riñón izquierdo, se completa el diagnóstico con tomografía computada que muestra una masa sólida en riñón izquierdo hipercaptante, heterogénea que ocupa la mitad superior del riñón, (Figura 1) a nivel del bazo se describe una formación sólida de 5 cm compatible con secundarismo (Figura 2), la RNM confirma el diagnóstico de la tomografía, con diagnóstico de tumor renal con metástasis en bazo se indica el tratamiento quirúrgico. Se aborda por vía anterior por una incisión subcostal. Se realiza la nefrectomía y esplenectomía.

La histopatología informa tumor de riñón a células claras Fuhrman 2 de 7 cm con infiltración de grasa perirrenal y vena renal, estadio T3b (UICC 2002) (Figura 3) y la formación del bazo fue un infarto esplénico (Figura 4).

Si hubiese sido una metástasis en bazo del tumor renal al momento del diagnóstico hubiese sido un caso de muy baja frecuencia, ya que la mayoría de los tumores renales que debutan con metástasis lo hacen en pulmón, hueso como primera línea y menos frecuente en ganglios, hígado y suprarrenal.

