

Estimados Lectores

En este número de la Revista, Francisco D' Alessandro y cols., del Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, comunican los índices de resistencia de *Neisseria gonorrhoeae* en un estudio sobre 26 cepas de hombres y mujeres tomadas en el hospital. Alejandro Lorenzo Puerto Puerto y cols., del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, España, publican los resultados y las complicaciones de la colocación de cinta suburetral transobturatriz libre de tensión para el tratamiento de incontinencia de esfuerzo en 106 mujeres. Leandro Arribillaga y cols., del Centro Urológico Profesor Bengiό de Córdoba, analizan las diferencias clínicas y urodinámicas en 450 mujeres con incontinencia urinaria mixta e incontinencia urinaria de urgencia pura. Finalmente, Gustavo Frattini y cols., de diversos centros de Mar del Plata y del Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda, comparan la seguridad y eficacia de la anestesia tópica más local transperineal versus tópica sola en el manejo del dolor de la biopsia prostática.

Pablo Nicolás Contreras
Director del Capítulo de Publicaciones

Dear Readers

In this issue of the Journal, Francisco D' Alessandro et al., from Hospital Penna of the City of Buenos Aires, inform about the resistance index in *Neisseria gonorrhoeae* in a study of 26 men's and women's strains taken at the hospital. Alejandro Lorenzo Puerto Puerto et al., from San Pedro de Alcántara de Cáceres Hospital, Spain, publish the results and complications from the placement of tension-free transobturator suburethral tape for the treatment of stress incontinence in 106 women. Leandro Arribillaga et al., from Centro Urológico Profesor Bengiό [Urology Center] of Córdoba, analyze the clinical and urodynamic differences in 450 women suffering from mixed urinary incontinence and pure urge urinary incontinence. Finally, Gustavo Frattini et al., from different Centers in Mar del Plata and Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón of Avellaneda, compare the efficacy and safety of more local topical transperineal anaesthesia versus the topical one in prostate biopsy pain management.

Pablo Nicolás Contreras
Editor