

Hospital Rawson. Servicio de Urología
Jefe: Profesor Dr. Enrique Castaño

GRANULOMA TELANGIECTASICO DE URETRA POSTERIOR

Por los Dres. A. TRABUCCO; DARIO SARACENI y A. CHIMENTI

Sobre granulomas telangiectásicos radicados en la uretra no hemos podido encontrar descripciones en los libros clásicos de urología, tratando todos ellos de pólipos de distinta naturaleza, pero no de estas típicas reacciones inflamatorias llamadas en cierto momento batriomicomas por una supuesta etiología fungosa.

Tenemos en nuestros archivos dos historias clínicas en que se presentaba este tipo de neoformación inflamatoria cuyo diagnóstico anatómico ha sido hecho con el microscopio.

Expondremos sucintamente estas dos historias a fin de dejar constancia de los antecedentes y motivos que llevaron a estos enfermos a la revisión médica.

El primero de ellos, G. Z., de 32 años de edad, domiciliado en Lanús, F.C.S. Los antecedentes son de poca importancia y acude al médico para cerciorarse sobre su estado urogenital a fin de contraer matrimonio. Dice sentir algunas molestias en la uretra posterior con pesadez en periné y picazón en la parte anterior del pene. En sus antecedentes relata una blenorragia a los 21 años tratada con grandes lavajes y seguida luego con dilataciones de beniqués al mes de contraída la infección.

El examen no muestra nada de particular en los genitales externos, con uretra viable al explorador N° 22. Próstata sin nada digno de mención. Vesículas seminales no se palpa nada patológico, orinas límpidas sin filamentos y sin pus.

La uretroscopía revela una uretra posterior con cuello normal con verumontanun grande pudiéndose observar a la derecha de él y en la parte superior una formación que se dirige hacia adelante, de implantación pequeña y que se va ensanchando hacia su extremidad en forma de badajo de campana, de aspecto firme y de un tamaño aproximado al de un grano de uva bien pediculado. El color es rosado aunque más intenso en la extremidad libre, es decir en la parte ensanchada (figura 1).