

Tema Oficial.

LA PROSTATECTOMIA EXTRAVESICAL (30 OBSERVACIONES)

Por el Dr. OSCAR L. MARRUGAT

La prostatectomía extravesical actualmente tan en boga, es un procedimiento que tiene ya 40 años de edad, fué practicado por vez primera en dos enfermos en noviembre de 1908, por M. W. J. van Stockum en Rotterdam y publicada dicha técnica en el "Centralblatt für chirurgie" en enero de 1909 y en el mes de octubre del mismo año presentada en el XXII Congreso de Cirugía Francés; este procedimiento fué practicado por diversos cirujanos urólogos Europeos con leves variantes, hasta que reaparece en América del Norte en 1933 con Casper y Jacobs, pero a pesar de todo continúa en el anonimato para surgir nuevamente con las publicaciones de Th. Millin a partir de 1945, el procedimiento de Millin es similar al de Stockum salvo pequeñas variantes como la de prescindir del taponaje de la loge.

En lo referente a la técnica de dicho procedimiento no insistiré en ella por ser bien conocida por los colegas.

En cuanto al instrumental no creo que sea necesario ninguno especial, a pesar de haber ideado Millin unos y modificado otros para ser usados en la adenomectomía extravesical retropubiana.

La ventaja principal de este procedimiento es la de llegar a abordar el adenoma prostático extravesicalmente y que es una operación poco chocante y permite obtener un post-operatorio relativamente corto.

La experiencia que puedo aportar a estas jornadas, se basa en 30 observaciones que he seguido durante mi permanencia en el Hospital Cochin de Paris.

La edad predominante de los pacientes tratados con la técnica extravesical retropubiana, fué de 65 a 70 años, siendo el más joven de 54 años y el de más edad de 77.

Como anestesia se ha usado tanto la general con protóxido de azoe y la

mezcla de Schleich, así como la regional: raquíanestesia y epidural, habiendo en todos los casos dado excelentes resultados.

La mortalidad operatoria sobre los 30 casos fué sólo de un fallecimiento a los 6 días de intervenido a causa de una insuficiencia renal (observación N° 21).

El tiempo promedio en el post-operatorio fué de 28 días y la sonda uretral fué retirada a los 6 días termino medio, siendo el tiempo más breve de 5 días y el mayor de 12.

Discriminación del tiempo de extracción de la sonda uretral

En 9 casos	5 días
» 10 »	6 »
» 4 »	7 »
» 2 »	8 »
» 2 »	9 »
» 1 »	10 »
» 1 »	12 »

Los enfermos fueron levantados entre el 2^o ó 5er. días de retirada la sonda, sin que en ningún caso se halla notado ningún trastorno ni molestias en los pacientes. Como accidente post-operatorio merece destacarse que hemos observado un solo caso de incontinencia de orina en la observación N° 5 que solamente duró 7 días: la sonda había sido retirada a los 6 días de intervenido y presentó una incontinencia que desapareció a los dos días antes de ser dado de alta; estas incontinencias suelen presentarse en algunas oportunidades en forma permanente como en el caso presentado por Bouchard al Congreso Francés de Urología de 1946.

OBSERVACIONES

N° 1.— M. D. . . . de 63 años de edad, ingresa el 30/X/47, se opera el 4/XI/47 con anestesia general Schleich, se retira la sonda a los 7 días. Se levanta a los 9 días y se retira de alta el 12/XII/47.

N° 2.— J. K. . . . de 54 años de edad, ingresa el 1/XI/47, se opera el 8/XI/47, con anestesia general Schleich, y la sonda uretral se retira a los 6 días, y se levanta al 7^o día siendo dado de alta el 4/XII/47.

N° 3.— V. B. . . . de 76 años de edad, ingresa el 10/XI/47, se interviene el 18/XI/47, bajo anestesia general Schleich, la sonda se le retira a los 6 días y se comprueba una incontinencia de orina durante 7 días y a los 15 días de intervenido se va de alta en perfectas condiciones, el 30/XII/47.

Nº 4.—A. W. . . . de 56 años de edad, ingresa el 12/XI/47 siendo operado el 19/XI/47 con anestesia con Schleich, se le retira la sonda a los 12 días y se le da de alta el 6/XII/47.

Nº 5.—E. D. . . . de 69 años de edad, se interna el 20/XII/47, y es operado el 25/XI/47 con anestesia general protóxido de azoe, se le retira la sonda a los 6 días levantándose el 8º día, se le da de alta el 9/XII/47.

Nº 6.—R. G. . . . de 69 años de edad, ingresa el 19/XI/47, es operado el 29/XI/47, con anestesia general de protóxido de azoe, y se le retira la sonda a los 7 días, levantándose a los 10 días. Alta el 12/XII/47.

Nº 7.—E. V. . . . de 69 años de edad. Ingresa el 25/XI/47 y es intervenido el 1/XII/47, con anestesia general de protóxido de azoe. La sonda se le retira a los 5 días, levantándose a los 8 días, es dado de alta el 18/XII/47.

Nº 8.—A. Th. . . . de 70 años de edad. Ingresa el 24/XI/47, operación el 1/XII/47, con anestesia general regional epidural, retirándose la sonda al 7º día. Se levanta a los 10 días y es dado de alta el 17/XII/47.

Nº 9.—L. G. . . . de 74 años de edad, ingresa el 28/XI/47 es intervenido el 3/XII/47 bajo anestesia regional epidural se le retira la sonda uretral a los 10 días y se levanta a los 13 días siendo dado de alta el 31/XII/47.

Nº 10.—L. N. . . . de 68 años de edad, ingresa el 9/XII/47, y es operado el a los 9 días, es dado de alta el 18/II/48.

Nº 11.—F. C. . . . de 65 años de edad, ingresa el 1/XII/47 es operado el 19/XII/47 bajo anestesia raquídea se retira la sonda a los 8 días, se levanta a los 11 días y es dado de alta el 5/I/48.

Nº 12.—L. J. . . . de 67 años de edad, ingresa el 28/XII/47, siendo operado el 3/1/48, bajo anestesia regional epidural la sonda se le retira a los 6 días. A los 9 días se levanta y es dado de alta el 26/II/48.

Nº 13.—E. A. . . . de 74 años de edad, ingresa el 28/XI/47, operación el 5/XII/47, bajo anestesia regional epidural y la sonda se le retira a los 5 días, siendo levantado a los 7 días y es dado de alta el 29/XII/47.

Nº 14.—R. B. . . . de 60 años de edad, ingresa el 25/XI/47, es operado el 5/XII/47, bajo anestesia general Schleich, la sonda se le retira a los 5 días, a los 6 días se levanta y es dado de alta el 22/XII/47.

Nº 15.—A. L. . . . de 65 años de edad, ingresa el 8/I/48, es operado el 12/I/48, bajo anestesia general Schleich, retirándose la sonda a los 5 días, a los 8 días se levanta 15/XII/47 con anestesia general Schleich, retirándosele la sonda a los 7 días y se levanta y es dado de alta el 1/II/48.

Nº 16.—R. F. . . . de 60 años de edad, ingresa el 8/I/48, se interviene el 13/I/48, bajo anestesia general Schleich, retirase la sonda a los 6 días, se levanta a los 9 días, y es dado de alta el 26/I/48.

Nº 17.—A. B. . . . de 64 años de edad, ingresa el 9/I/48, es intervenido el 17/I/48, bajo anestesia general Schleich se le retira la sonda a los 6 días, a los 8 se levanta y es dado de alta el 21/II/48.

Nº 18.—E. G. . . . de 60 años de edad, ingresa el 9/I/48, se le opera el 20/I/48, con anestesia epidural se le retira la sonda a los 6 días, se levanta a los 9 días, y se va de alta el 9/II/48.

Nº 19.—J. G. . . . de 65 años de edad, ingresa el 20/I/48, y es operado el 30/I/48, con anestesia general a protóxido de azoe. A los 5 días se le retira la sonda, se levanta a los 8 días y es dado de alta el 12/II/48.

Nº 20. — G. B. . . . de 68 años de edad, ingresa el 30/I/48, es intervenido el 4/II/48, bajo anestesia epidural, se le retira la sonda el 5º día, y se levanta al 6º día, se da de alta el 26/II/48.

Nº 21. — H. L. . . . de 72 años de edad ingresa el 1/II/48, es operado el 7/II/48, bajo anestesia regional epidural, fallece a los 6 días de intervenido a causa de una insuficiencia renal el 12/II/48.

Nº 22. — J. B. T. . . . de 54 años ingresa el 10/II/48 siendo operado bajo anestesia general Schleich el 17/II/48, se le retira la sonda a los 6 días, se levanta a los 8 días, se levanta a los 8 días, y es dado de alta el 2/III/48.

Nº 23. — B. P. . . . de 73 años de edad, se interna el 11/II/48, y es operado el 20/II/48, bajo anestesia general Schleich, la sonda le es retirada a los 5 días, y sale de alta el 15/III/48 habiéndose levantado a los 9 días.

Nº 24. — M. J. . . . de 70 años, se interna el 12/II/48, se le opera el 21/II/48, con anestesia general Schleich, se retira la sonda a los 6 días, se levanta a los 9 días, y es dado de alta el 16/III/48.

Nº 25. — F. G. . . . de 74 años de edad ingresa el 2/III/48, se opera el 10/III/48, bajo anestesia general Schleich, se le retira la sonda uretral a los 6 días, a los 8 días se levanta y es dado de alta el 24/III/48.

Nº 26. — F. G. . . . de 66 años de edad, se interna el 13/II/48, se le interviene el 19/II/48, bajo anestesia general Schleich, la sonda uretral se retira a los 5 días, se levanta a los 7 y es dado de alta el 16/IV/48.

Nº 27. — A. Y. . . . de 72 años de edad, ingresa el 9/III/48, se le opera el 12/III/48 con anestesia general Schleich, se le retira la sonda a los 6 días se levanta a los 7 y es dado de alta el 26/IV/48.

Nº 28. — J. W. . . . de 67 años de edad, ingresa el 10/III/48, se opera el 20/III/48, se interviene bajo anestesia regional epidural, retírase la sonda a los 5 días, se levanta a los 8 días, y es dado de alta el 7/IV/48.

Nº 29. — J. G. . . . de 71 años de edad, ingresa el 7/III/48 se interviene el 17/III/48, bajo anestesia regional epidural, se le retira la sonda uretral a los 9 días, a los 11 días se levanta y es dado de alta el 5/V/48.

Nº 30. — L. F. . . . de 74 años edad, ingresa el 25/III/48, se interviene el 31/III/48, bajo anestesia regional epidural retirándosele la sonda a los 5 días. A los 7 días se levanta y es dado de alta el 12/IV/48.